

. Перелік оперативних втручань.

<b>Вид операції</b>		<b>Стадії</b>	<b>Особливості використання</b>
<b>Основний перелік оперативних втручань</b>	Видалення вилочкової залози з пухлиною (тімомтімектомія).	I стадія	Можливе виконання оперативного втручання через передній торакотомний доступ.
	Комбіноване видалення вилочкової залози з пухлиною (тімомтімектомія) з резекцією суміжних ушкоджених органів.	I-IV стадії	Серед доступів перевага надається поздовжній серединній стернотомія.

**Протипокази до оперативного втручання:** наявність супутньої патології в стадії суб- та декомпенсації.

**Таблиця №4.** Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

<b>Вид лікування</b>	<b>Загальна доза, фракціонування та зони опромінення</b>	<b>Особливості використання</b>
<b>Доопераційна променева терапія</b>	РВД - 3-4Гр, СВД - 20-25Гр (середостіння)	
<b>Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій</b>	РВД - 2Гр, СВД - 40-45Гр (середостіння)	
<b>Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.</b>	РВД - 2Гр, СВД - 60-65Гр (середостіння)	
<b>Самостійна променева терапія</b>	1. Радикальна променева терапія: I етап РВД - 2Гр, СВД - 44Гр, II етап РВД - 2Гр, СВД – до 70Гр за два етапи;	
<b>Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування</b>	1. РВД - 2Гр, СВД - 40-45Гр, або 2. РВД - 3Гр, СВД - 30Гр,	

**Протипокази до променевого лікування:** відсутність морфологічного підтвердження діагноза та загальні протипоказання до променевої терапії.

**Таблиця №5.** Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів	Особливості використання
<b>Основний перелік схем медикаментозного лікування.</b>	Доксорубіцин (40 мг/м <sup>2</sup> – 1 день), Цисплатин (50 мг/м <sup>2</sup> – 1 день), Вінкристин (0,6 мг/м <sup>2</sup> – 3 день), Циклофосфамід (700 мг/м <sup>2</sup> – 4 день)
	Цисплатин (60 мг/м <sup>2</sup> – 1 день), Етопозид (125 мг/м <sup>2</sup> – 2-4 дні)
	Цисплатин (20 мг/м <sup>2</sup> – 1-5 дні), Етопозид (100 мг/м <sup>2</sup> – 1-5 дні), Блеоміцин (30 мг - 1, 8, 15 дні)
	Доксорубіцин (25 мг/м <sup>2</sup> – 1, 15 дні), Блеоміцин (10 мг/м <sup>2</sup> - 1, 15 дні), Вінбластин (6 мг/м <sup>2</sup> – 1, 15 дні), Дакарбазин (375 мг/м <sup>2</sup> – 1, 15 дні)
<b>Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні)</b>	Гемцитабін (1250 мг/м <sup>2</sup> - 1, 8 дні), Цисплатин (80 мг/м <sup>2</sup> – 1 день)

**Показання до редукції дози:** лейкопенія, нейтропенія, анемія II ступеня важкості

**Протипокази до медикаментозного лікування:** загальний важкий стан хворого.